Epileptischer Anfall

zu treffende Maßnahmen

- Rettungsdienst alarmieren
- Patient während dem Anfall vor weiteren Gefahren schützen
    - harte, scharfkantige, spitze, etc. Gegenstände aus dem Weg räumen an denen sich der Patient verletzen könnte
    - dem Patient **nichts** in den Mund stecken um vor einem Zungenbiss zu schützen (kann zu Kieferbruch führen)
    - keine der folgenden Maßnahmen durchführen, so lange der Krampf noch andauert
- Sauerstoff geben falls vorhanden
- Wärmeerhalt
- Blutzucker bestimmen wenn möglich (ggf. war Unterzuckerung der Auslöser)
- Während der Nachschlafphase beim Patienten bleiben, ihn aber nicht wecken
    - bis zum Erwachen in die stabile Seitenlage bringen
- dem Patient erklären was passiert ist wenn er wieder ansprechbar ist
- vor Schaulustigen schützen
- Wenn möglich, Dokumentation der Ereignisse und deren Dauer für den Rettungsdienst

Quellenangabe

- Erste-Hilfe kompakt - Notfallstichwort: Epileptischer Anfall! Was tun?, Empfehlungen des Bundesfeuerwehrarztes, Deutscher Feuerwehrverband

Stichwörter

Epilepsie, Krampf